

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΘΠΣ)

| MDC (2-ψήφιος αριθμός) | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (MDC + 3-ψήφιος αριθμός) | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (έως 10 λέξεις) | ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΝΟΣΟΙ (κωδικοί κατά ICD-10, ο ένας κάτω από τον άλλο) | ΟΡΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θ.Π.Σ. (κείμενο έως 150 λέξεις) | ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Θ.Π.Σ. (κείμενο έως 150 λέξεις) | ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Θ.Π.Σ. (κείμενο έως 150 λέξεις) | ΑΡΧΕΙΟ PDF | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Θ.Π.Σ. (κείμενο έως 150 λέξεις) |
|---------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|--|------------|---|
|---------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|--|------------|---|

MDC 08 - Παθήσεις και δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος και συνεκτικού ιστού

08-001

Οστεοπόρωση - Γυναίκες - Με Κάταγμα - Σπονδυλικό

M80.0

Γυναίκες ασθενείς με ανάγκη αγωγής για οστεοπόρωση με κάταγμα κατά τη διάγνωση - Σπονδυλικό

Σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας της οστεοπόρωσης κρίνεται σκόπιμη η συγχρόνηση 400-800 IU βιταμίνης D3 ή ισοδύναμου αναλόγου βιταμίνης D, αλλά και η πρόσληψη (διαιτητική ή/και φαρμακευτική) 1200 mg ασβεστίου. Σκόπιμη επίσης κρίνεται και η συνεχής σύσταση για σωματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος και κατάχρησης αλκοόλ, καθώς και η προφύλαξη από τον κίνδυνο πτώσεων.

οστεοπόρωση με κάταγμα κατά τη διάγνωση - Σπονδυλικό

M80.1

M80.2

M80.3

M80.4

M80.5

M80.8

M80.9

S22.0

S22.1

S32.0

S32.7

S32.8

M48.4

M48.5