

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΘΠΣ)

MDC (2-ψήφιος αριθμός)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (MDC + 3-ψήφιος αριθμός)	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (έως 10 λέξεις)	ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΝΟΣΟΙ (κωδικοί κατά ICD-10, ο ένας κάτω από τον άλλο)	ΟΡΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θ.Π.Σ. (κείμενο έως 150 λέξεις)	ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Θ.Π.Σ. (κείμενο έως 150 λέξεις)	ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Θ.Π.Σ. (κείμενο έως 150 λέξεις)	ΑΡΧΕΙΟ PDF	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Θ.Π.Σ. (κείμενο έως 150 λέξεις)
MDC 08 - Παθήσεις και δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος και συνεκτικού ιστού	08-003	Οστεοπόρωση - Γυναίκες - Με Κάταγμα - Ισχίου	S72.0	Γυναίκες ασθενείς με ανάγκη αγωγής για οστεοπόρωση με κάταγμα κατά τη διάγνωση - Ισχίου	Σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας της οστεοπόρωσης κρίνεται σκόπιμη η συχορήγηση 400-800 IU βιταμίνης D3 ή ισοδύναμου αναλόγου βιταμίνης D, αλλά και η πρόσληψη (διαιτητική ή/και φαρμακευτική) 1200 mg ασβεστίου. Σκόπιμη επίσης κρίνεται και η συνεχής σύσταση για σωματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος και κατάχρησης αλκοόλ, καθώς και η προφύλαξη από τον κίνδυνο πτώσεων.	οστεοπόρωση με κάταγμα κατά τη διάγνωση - Ισχίου		
			S72.1 S72.2 S72.3 S72.4 S72.7 S72.8 S72.9 S32.4 M80.0 M80.1 M80.2 M80.3 M80.4 M80.5 M80.8 M80.9					